

Шляпка: Диаметр 5-10 см, в молодости шаровидная, покрытая общим покрывалом, затем постепенно разворачивается до распростертой, при этом редко приобретая более или менее правильную форму. Лимонно-желтая или зеленоватая (а иногда и почти белая) поверхность шляпки покрыта крупными охристо-коричневатыми остатками общего покрывала. Мякоть беловатая, довольно толстая, с неприятным запахом, напоминающим запах сырого картофеля.

Пластинки: Частично приросшие или свободные, частые, довольно узкие, белого или желтоватого цвета.

Споровый порошок: Белый.

Ножка: Высота 5-10 см, толщина 1-1,5 см, цилиндрическая, с клубневидным утолщением в нижней части, полая, светлее шляпки. Кольцо широкое, свисающее, цвета шляпки или светлее. Вольва приросшая.

Распространение: Растет в августе-сентябре в лесах различного типа, в некоторые сезоны плодоносит довольно обильно, появляясь большими группами.

Сходные виды: Мухомор поганковидный можно перепутать с бледной поганкой (*Amanit a phalloides*
), которая отличается гладкой, лишенной остатков частного покрывала шляпкой и свободной вольвой. По причине этого сходства
Amanita citrina
и имеет такое странное, на первый взгляд, название.

Съедобность: Гриб несъедобен или слабо ядовит.

Замечания автора: К этому грибу у меня замечаний нет. Жаль лишь, что при фотографировании (что на пленку, что на цифру) куда-то пропадал изумительный лимонный оттенок. Изумительный настолько, что может это и не оттенок вовсе, а какой-то психоделический эффект. Аберрация восприятия, принципиально не фиксируемая современными техническими средствами.