Я думаю многие из нас любят собирать грибы. У нас в лесах и посадках грибы начинают появляться ближе к лету и растут как правило почти до конца осени. Нередко во время собирания грибов можно встретить так называетмые грибы двойники, которые сбивают нас с толку. Возьмем например белый гриб, ведь у него есть целых два двойника которые к тому же еще и ядовиты, это желчный гриб или горчак, и чертов гриб. Если вы знаете несколько особенностей двойников - то отличить их будет совсем не сложно. Мы постарались собрать известные нам грибы двойники в нескольких таблицах, которые находятся ниже, а так же наши рекомендации, как их проще всего отличить друг от дружки, чтобы случайно не положить в корзину несъедобный или не дай бог ядовитый гриб.

Белый гриб

Белый гриб:
светлая сетка расположена по всей ножке

мякоть всегда белая

Желчный гриб:
верхняя часть ножки покрыта темной сеткой; гриб очень горький на вкус

после разреза мякоть сразу розовеет

Сатанинский гриб:
трубчатый слой гриба – красноватый, на толстой ножке – красный сетчатый рисунок

мякоть на изломе становится лиловой

Опята

Настоящие опята:
пластинки всегда белые, кремовые и никогда не темнеют, на пенке имеется кольцо из пленки

Серно-желтые опята:
пластинки серно-желтые

Кирпично-красные опята:
пластинки беловато-кремовые; быстро темнеют и становятся лиловато-буроватыми или черновато-оливковыми

Моховики и маслята

Моховик

Маслята

Перечный гриб:
более бурая шляпка; красновато-вишневый оттенок пор трубочек и ножки; вкус перечно-жгучий

Лисички

Настоящая лисичка:
шляпка светло-желтая

Ложная лисичка:
шляпка красновато-оранжевая или оранжево-желтая

из надломленной шляпки ложной лисички выделяется белый сок

Шампиньон

Шампиньон:
пластинки на нижней поверхности шляпки сначала розовые, а затем темнеют

Поганка:
у смертельно ядовитой поганки пластинки всегда белого цвета

Первая помощь при отравлении грибам

- Необходимо немедленно вызвать врача
- До прихода врача больному проводят промывание желуд
- Пострадавшему нужно дать активированный уголь, уложи в постель и поить водой или крепким чаем
- Для уточнения диагноза нужн сохранить все несъеденные грибы

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 1)

Гриб	Трубчатый слой	Мякоть	Ножка
Желчный гриб (несъедобный гриб)			
Серовато-розовый, грязно-розовый	Белая, на изломе розовеет, очень горькая	С бурой сеточкой	
Белый гриб			
Белый, сероватый, затем желтовато-зеленый	Белая, на изломе цвет не изменяется	С бурой сеточкой	
Подберезовик			
Беловатый, сероватый	Белая, на разрезе цвет не изменяется	С бурой сеточкой	

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 2)

Гриб	Шляпка	Пластинки	Ножка
Мухомор белый (смертельно ядовит)	Белая, сначала округло-[illegible]	[illegible]	[illegible] вольво[illegible]
Мухомор вонючий (смертельно ядовит)	Белая, полушаровидная, [illegible]	[illegible]	[illegible], окружена [illegible]
Гриб-зонтик белый	Распростертая, белова[illegible]	[illegible]	[illegible]лища нет, кольцо [illegible]
Вольвариелла красивая			

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 3)

Гриб	Шляпка	Мякоть	Пластинки	
Мухомор пантерный (ядовитый гриб)				
Мухомор серо-розовый				

Бледно-красноватая, с[illegible]

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 4)

Гриб	Шляпка	Пластинки	Ножка
Мухомор красный (ядовитый гриб)	Плосковыпуклая, ярко-[illegible]	[illegible]	[illegible]
Мухомор поганковидный (несъедобный гриб)	Плосковыпуклая, желт[illegible]	[illegible]	[illegible]
Сыроежка золотисто-красная			

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 5)

Гриб	Шляпка	Пластинки	Ножка
Лепиота щитковая			
Чешуйница гребенчатая (несъедобный гриб)			

Выпуклая, затем плоскостью

Выпуклая, с рыже-бурым бугорком, беловатая, с концентрическими кори

На бугорке, беловатая, с концентрическими, с кори

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 6)

Гриб	Шляпка	Пластинки	Ножка
Ложноопенок серно-желтый (ядовитый гриб)			

Серно-желтая, в центре красноватые, затем	Серно-желтые, затем	Серно-желтая
Опенок зимний		

Медово-желтая или кремовая	Овсяно-желтые или кремовые	К основанию коричнево-черно-бурая, бархатистая

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 7)

Гриб	Шляпка	Пластинки	Споровый порошок
Говорушка восковатая (смертельно ядовит)	Белая, с водянистыми концентрическими кругами	Белые	Белый
Подвишенник	Белая или слегка желтоватая, с темными концентрическими кругами	Белые	Белый

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 8)

Гриб	Шляпка	Пластинки	Ножка
Рядовка серно-желтая (гриб ядовит)			

3—10 см в диаметре, т... | Редкие, желтые, серно-желтые ... | 5—8 см длины, 0,7—3 см толщины, ... | Запах мякоти неприятный ...

До 15 см в диаметре, толстая, мясистая, ... | Частые, серно-желтые, ... | 4—5 см длины, до 2 см толщины, ... | желто-оливковая. Мяко...

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 9)

Гриб	Шляпка	Пластинки	Ножка
Бледная поганка (смертельно ядовит)	Белая, беловатая	Свободные, белые	В основании вздутая, окруженная вольвой. Кольц
Сыроежка чешуйчатая			

	Зеленоватая, серо-зеленоватая	Свободные, белые
	Шоколадно-серая, серо-зеленоватая	Прирослые к ножке, белые
	Бинарный сероватая	Свободные, сначала белые
	Белая, от прикосновения желтеющая	Свободные, сначала белые

Клубневидного вздутия, вольвы и кольца нет	Клубневидного вздутия, вольвы и кольца нет	Без вздутия и вольвы, с кольцом
Фиолетовые, тем	Утолщенная красноватая, без вольвы, с кольцом	Утолщенная красноватая, без вольвы, с кольцом

Желтовато-бурая с роз…

Отличительные признаки грибов двойников (Таблица 10)

Гриб	Шляпка	Пластинки	Ножка
Рядовка ядовитая (гриб ядовитый)	До 12 см в диаметре, п…	Частые, широкие, …	
Рядовка заостренная (гриб ядовитый)	До 8 см в диаметре, ко…	Частые, …	
Рядовка землисто-серая			

До 8 см в диаметре, у м [illegible]