



Плодовое тело: Проходит две стадии развития, несовершенную (бесполою) и совершенную. На первой стадии образуются множественные "конидии" мозговидной, лопастевидной или язычковидной формы, высотой не более 1 см; затем они превращаются в блюдцевидные "апотеции" диаметром до 3 см, обычно сросшиеся между собой, наползающие друг на друга. Цвет - от мясо-красного до лилово-фиолетового, насыщенный, яркий. Поверхность гладкая. Мякоть плотно-желеобразная.

Споровый порошок: Белый.

Распространение: Растет большими группами с середины августа до середины ноября на основательно подгнивших останках лиственных деревьев, предпочитая березу; встречается часто.

Сходные виды: В качестве "двойника" аскокорине мясной источники указывают *Ascocoryne cylichnium*

, гриб похожий, но не образующий бесполой конидиальной формы. Так что при наличии экземпляров на разных стадиях развития различить эти достойные корины можно безо всякого труда.

Съедобность: Неизвестна; в любом случае, гриб слишком мал для кулинарных интересов.

Замечания автора: Был разочарован, что удивительный гриб прекрасной расцветки называется *Ascocoryne sarcoides*, попросту аскокорине мясная (мясная!), и встречается очень часто. Я же его видел впервые и был просто поражен красотой. Ничего мясного, всё воздушное и изысканное. И не две формы, а три - на третьей он превращается в сизую медузу.

Так вот и спрашивается - аскокорине ли мясная?