



Плодовое тело: Однолетний "трутовик", внешность которого радикально меняется в процессе развития. Начинает образование на валежнике, пне или сухостое; очень скоро середина образования темнеет, края начинают отгибаться, и натечное образование превращается в довольно бесформенные, часто сросшиеся между собой консоли из кожистых "шляпок" 2-5 см шириной и около 0,5 см толщиной. Поверхность опушенная, войлочная. Окраска также значительно меняется со временем; белые края уступают место общей серо-бурой гамме, отчего гриб действительно выглядит словно "опаленный". Мякоть серовата, кожистая, жесткая, с возрастом становится "пробковой" и очень ломкой.

Гименофор: Тонкий, с очень мелкими порами; отделен от стерильной части тонкой

"линией", заметной вооруженным глазом при разрезе. У молодых экземпляров имеет пепельную окраску, затем постепенно темнеет почти до черного.

Споровый порошок: Беловатый.

Распространение: Посвместно встречается в течение всего года, предпочитая отмершую древесину лиственных пород. Вызывает белую гниль.

Сходные виды: Учитывая массу форм и возрастную изменчивость гриба, говорить о сходных видах *Bjerkandera adusta* просто грех.

Съедобность: Трутовик.

Замечания автора: Эта опаленная бьеркандера - один из тех грибов, которые фактически известны всем и каждому, а для номинального знакомства необходимо просить помощи на форуме, потом листать огромную книгу про трутовики 1953 года издания, спасенную кем-то из пожарища Воронежской библиотеки. Но всё, конечно, кончается хорошо.