



Плодовое тело: Шаровидное, часто несколько сплюсненное, ножка отсутствует, диаметр 3-6 см. Цвет молодого гриба белый, затем становится желтоватым. (Когда разрывается внешняя белая оболочка, гриб становится темным, почти черным.) Мякоть, как и у всех дождевиков, вначале белая, но с возрастом темнеет. Когда споры созревают, верхняя часть плодового тела разрывается, образуя отверстие для выброса спор.

Споровый порошок: Коричневый.

Распространение: Растет с начала лета до середины сентября в лесах различного типа, на лугах, вдоль дорог, предпочитаемая богатые почвы.

Сходные виды: Похожая порховка свинцово-серая отличается как меньшими размерами, так и более светлым (свинцово-серым, как можно заключить из названия)

цветом внутренней оболочки. На некоторых стадиях развития эту порховку можно также перепутать с ложнодождевиком обыкновенным, *Scleroderma citrinum*, который отличается черной, очень жесткой мякотью, и более грубой бородавчатой кожей.

Съедобность: В молодости, пока мякоть сохраняет белизну, порховка чернеющая - съедобный гриб невысокого качества, как и все дождевики.

Замечания автора: Очень изящно выглядит молодая крупная порховка в темном ельнике, в густом опаде. Глядя на выступающую из земли белоснежную полусферу, можно задуматься о какой-то невероятной подземной птице, откладывающей таким образом свои яйца.