



Плодовое тело: Рого- или булавовидное, маленькое (высота 0,5 - 1,5 см, толщина 0,1 - 0,3 см), обособленное или сросшееся у основания с другими, далее, как правило, не разветвляющееся. Цвет - светло-желтый, яичный; с возрастом может выцветать до грязно-оранжевого. Консистенция упруго-студенистая, резиновая.

Споровый порошок: Белый (споры бесцветные). Спороносный слой расположен почти на всей поверхности плодового тела гриба.

Распространение: Роговидная калоцера - гриб неприметный, распространенный повсеместно. Произрастает на сырой, основательно прогнившей древесине лиственных, реже хвойных пород, с середины или конца июля по самый ноябрь (или до первых морозов, в зависимости от того, что наступит раньше). В силу общей неприметности и малоинтересности для широкого круга любителей информация о сроках плодоношения может быть не совсем точной.

Сходные виды: Литературные источники сравнивают *Calocera cornea* с близкими, но менее распространенными родственниками наподобие *Calocera pallidospatulata*

- у той есть светлая "ножка", на которой споры не образуются.

Съедобность: Сложно сказать наверняка.

Замечания автора: Чем хороша калоцера клейкая - так это тем, что она, наверное, едина в своем роде, и потому легко поддается определению. (Всему остальному - и нахождению, и фотографированию, она поддается несколько хуже.) И было бы очень обидно, если бы среди маленьких желтеньких рожковидных грибочков, высыпающих время от времени на дубовых пнях, было бы много трудноотличимых и вместе с тем не родственных видов. Будем надеяться, что это не так, и природа справедлива.