Плодовое тело: Состоит из крупных листовато- или языковидных шляпок, срастающихся у основания и образующих большие "этажерки". Диаметр каждой шляпки

10-30 см, толщина у основания - 3-5 см. Цвет - серовато-желтоватый, светлый; с возрастом может выцветать до белесого или, напротив, зеленеть от плесени. Края шляпок волнистые, у молодых экземпляров могут быть сильно загнуты вниз; поверхность гладкая или несколько опушенная. Мякоть светлая, кожистая, толстая, очень плотная, с заметным запахом, многими определяемым как "неприятный".

Гименофор: Шипиковый; шипы частые, тонкие и длинные (до 2 см), мягкие, довольно ломкие, у молодых грибов белые, с возрастом, как и шляпка, меняют цвет.

Споровый порошок: Белый.

Распространение: Встречается с середины июля в лесах различного типа, поражая ослабленные лиственные деревья. Однолетние плодовые тела могут держаться до осени, но в конце концов, как правило, бывают поглощены насекомыми. Сростки климакодона северного могут достигать весьма внушительных объемов - до 30 кг.

Сходные виды: Если помнить о шипиковом гименофоре и аккуратном черепитчатом произрастании, *Climacodon septentrionalis* трудно с чем-то перепутать. В литературе можно найти упоминания о редком *Creopholus cirrhatus*, который мельче и выглядит не так правильно.

Съедобность: Нет.

Замечания автора: Как и о большинстве трутовиков, о северном климакодоне мне сказать, считай, и нечего. Да и не мне одному - несмотря на то, что *Climacodon septentrionalis* считается опасным паразитом леса, информации о нем и обо всём его роде очень мало. А ведь он даже красив - как может быть красива белая этажерка на кривой замшелой березе.