



**Шляпка:** Довольно крупная для древесной коллибии, 3-7 см в диаметре (порой и больше), у молодых экземпляров полушаровидная, компактная, с возрастом постепенно расправляется, сохраняя, как правило, геометрически правильную форму. По цвету - вариации на тему коричневого (красноватый, желтоватый), преимущественно "живых", насыщенных тонов; окраска может быть неравномерной, в частности, края шляпки нередко выделяются более светлым цветом. Поверхность гладкая, нередко слегка маслянистая, как у коллибии каштановой, *Collybia butyracea*. Мякоть шляпки относительно тонкая (визуально гриб кажется более мясистым), светлая, без особого запаха и вкуса.

**Пластинки:** Частые, сравнительно узкие, слабо приросшие или приросшие зубцом. У молодых экземпляров белые, с возрастом приобретают желтоватую или даже рыжую

окраску.

**Споровый порошок:** Белый.

**Ножка:** 4-8 см в высоту и 0,3 - 0,8 см в толщину, цилиндрическая, полая, в соответствии с условиями произрастания может приобретать самые удивительные искривления. Окрашена в ту же гамму, что и шляпка, но значительно светлее: в верхней части может быть практически белая (особенно у молодых экземпляров), по мере же приближения к субстрату темнеет до густо-коричневого. Каждая ножка коллибии изогнутой является в своем роде неповторимой личностью: ее развитие протекает в строгой зависимости от того, насколько глубоко под корой мертвого дерева сформировались примордии.

**Распространение:** Коллибия изогнутая встречается повсеместно на остатках деревьев (как хвойных, так и лиственных), а также на лесной подстилке, где, впрочем, не так заметна по причине заурядной, не искривленной ножки. Растет, как правило, небольшими группами, но в хорошие сезоны довольно часто. Сроки плодоношения не вполне ясны: литература указывает на конец лета - середину осени, грибники рассказывают о встречах с этой коллибией уже в конце мая-начале июня.

**Сходные виды:** Будучи на дереве, *Collybia distorta* отращивает себе длинную изогнутую ножку, не позволяющую спутать ее ни с какими другими видами своего рода. В трудном случае на помощь придут пластинки: они очень частые и светлые, практически белые, особенно у молодых грибов. На земле, впрочем, коллибия изогнутая несколько теряет свое лицо, и здесь ее можно спутать и с крупным экземпляром коллибии лесолюбивой, *Collybia dryophila*, и даже с особо окрашенным экземпляром коллибии каштановой.

**Съедобность:** Ядов не содержит, так что попробовать в голодный год, наверное, можно. Но лучше до такого всё-таки не доводить.

**Замечания автора:** *Collybia distorta* напоминает мне обыкновенную коллибию масляную, которой везде много, но никто ей не рад, взобравшуюся в поисках пропитания на погибший древесный ствол. Для древоедных коллибий она слишком вещественна и плотна; глядя на нее, создается ощущение, что ее как-то больше, чем должно быть на

самом деле. При этом, однако, впечатления, что этот симпатичный гриб занимает не свое место, не складывается: промысловые древесные грибы, опята и вешенки, существуют словно бы в другой плоскости. И пусть эта плоскость может проходить сквозь то же замшелое бревно - что с того? Грибы не подчиняются закону, который люди силятся навязать всей живой природе.