Шляпка: В молодости желтоватая, вытянутая, закрытая, с возрастом раскрывается и светлеет, благодаря тонкой мякоти и выступающим пластинкам напоминает полураскрытый зонтик. В центре сохраняется круглое пятно более темной окраски. Как правило, шляпка до конца раскрыться не успевает, оставаясь полураспростертой. Поверхность складчатая. Диаметр шляпки составляет 1,5-3 см.

Пластинки: Редкие, приросшие к своеобразному воротничку (коллариуму); в молодости светло-сероватые, с возрастом чернеют. Тем не менее, в отличие от других представителей рода Coprinus, автолизом навозник складчатый не страдает и, соответственно, пластинки в "чернила" не превращаются.

Споровый порошок: Черный.

Ножка: 5-10 см в высоту, тонкая (1-2 мм), гладкая, беловатая, очень хрупкая. Кольцо отсутствует. Как правило, где-то через 10-12 часов после выхода гриба на поверхность ножка под воздействием обстоятельств подламывается, и гриб оказывается на земле.

Распространение: Встречается повсеместно на лугах и вдоль дорог с конца мая до середины октября, но относительно малозаметен по причине очень короткого жизненного цикла.

Сходные виды: Существует еще несколько более редких представителей рода Coprinus, отличить которые от навозника складчатого неспециалисту практически невозможно. В молодом виде *Coprinus plicatilis* можно перепутать с больбитиусом золотистым (
Bolbitius vitellinus
), но буквально через пару часов ошибка становится очевидной.

Съедобность: Неизвестна. Видимо, никто не проверял.

Замечания автора: Мне, можно сказать, повезло: на моих глазах свершилось зарождение, рассвет и падение целой семьи складчатых навозников. Драма разыгралась у порога моего дома, и развязки пришлось ждать до самого вечера, пока тихий дождик не опрокинул в грязь последних представителей славного рода. Тут всё и кончилось.