



Псевдошляпка: Диаметр 2-6 см, бокаловидной или седловидной (сплюснутой с боков) формы, внутри светлая, гладкая, беловато-бежевая, снаружи - более темная (от серого до фиолетового), с пупырчатой поверхностью. Мякоть тонкая, сероватая, водянистая, без особого запаха и вкуса.

Спорносный слой: Расположен на внешней (темной, бугристой) стороне шляпки.

Споровый порошок: Белый.

Ножка: Высота 3-6 см, толщина - до 0,5 см, сероватая, близкая по цвету к внутренней

поверхности шляпки, гладкая или несколько бугристая, в верхней части нередко сужается.

Распространение: Встречается с середины лета до конца сентября (?) в лесах различных типов, предпочитая сырые места; появляется обычно группами. Часто селится во мхах и на сильно разложившихся остатках древесины.

Сходные виды: *Helvella macropus* обладает одним ярким признаком: ножкой, которая позволяет выделить этот гриб из целого ряда чашеобразных лопастников. Впрочем, от некоторых менее распространенных представителей этого рода отличить данный лопастник можно только по микроскопическим признакам.

Съедобность: Очевидно, несъедобен.

Замечания автора: Чашеобразный гриб, загадочно мерцающий в полумраке леса, напоминает кошмар алкоголика. Больше, к счастью, ничего о нем сказать нельзя. Конечно, есть соблазн как-нибудь после хорошего дождя найти где-нибудь заросли таких вот чашечек и испить из каждой до дна, но как-то жалко. Да и страшно: мало ли до чего можно дойти таким вот образом.