



**Шляпка:** Диаметр 12-20 см. белая, с возрастом желтоватая, иногда с желтыми пятнами, мясистая, сначала плоско-выпуклая, затем воронковидная, с завернутым вниз краем. Мякоть толстая, очень плотная, на изломе желтеет. Выделяет очень едкий белый сок.

**Пластинки:** Пластинки чуть нисходящие по ножке, редкие, сначала белые, затем желтоватые.

**Споровый порошок:** Белый.

**Ножка:** Короткая и толстая (длина до 6 см, диаметр до 4 см), цилиндрическая,

сплошная, гладкая, белая или желтоватая, при надавливании темнеет.

**Распространение:** Встречается с июля по октябрь в лиственных, смешанных и хвойных лесах, нередко в зрядных количествах, особенно летом.

**Сходные виды:** От белого подгруздка (*Russula delica*) отличается наличием едкого сока, гораздо более плотной, "резинообразной" мякотью и условиями произрастания. От груздя же перечного (*Lactarius piperatus*) скрипицу отличить можно лишь по второстепенным признакам, таким как более короткая и толстая ножка, более редкие пластинки и некоторое пожелтение мякоти на изломе. Многие грибники эти два вида млечников не различают и ничего при этом не теряют.

**Съедобность:** Гриб потенциально съедобен. На практике же в пищу не годится.

**Замечания автора:** Всё, что сказано для перечного груздя, *Lactarius piperatus*, верно и для скрипицы. Эти два вида - идея млечника, доведенная до абсурда и балансирующая на грани вырождения в собственную противоположность. Зрелище поучительное и жалкое.