



**Шляпка:** Беловатая различных оттенков (кремовая, светло-серая, розоватая), подушковидной формы, в молодости близка к полушаровидной, затем становится более распростертой, хотя полностью, в отличие от обычного подберезовика, раскрывается редко; диаметр шляпки 3-8 см. Мякоть белая, нежная, без особого запаха и вкуса.

**Спороносный слой:** В молодости белый, с возрастом приобретает сероватый цвет. Отверстия трубок неровные, угловатые.

**Споровый порошок:** Оливково-бурый.

**Ножка:** Высота 7-10 см (в густой траве бывает и выше), толщина 0,8 - 1,5 см, у шляпки

сужается. Цвет белый, покрыта белыми чешуйками, которые с возрастом или при высушении темнеют. Мякоть ножки волокнистая, но по сравнению с обычным подберезовиком более мягкая; в основании приобретает голубоватый цвет.

**Распространение:** Встречается с середины июля до начала октября в лиственных и смешанных лесах (образуя микоризу главным образом с березой), предпочитает сырые места, охотно растет по краям болот. Попадает не очень редко, но особой урожайностью не отличается.

**Сходные виды:** От близкородственного подберезовика обыкновенного (*Leccinum scabrum*) отличается очень светлым цветом шляпки. Другие похожие виды рода *Leccinum* (например, пресловутый белый подосиновик, *Leccinum percandidum*) активно меняют цвет на изломе, что и служит поводом для объединения в понятие "подосиновик".

**Съедобность:** Гриб, разумеется, съедобен; в книгах его ругают за водянистость и невзрачность, невыгодно сравнивая с нормальным подберезовиком, но я бы поспорил. У белого подберезовика не такая жесткая ножка, да и шляпка, если удастся донести ее до дома, выделяет не больше воды, чем шляпка обычного подберезовика.

**Замечания автора:** Так или иначе, я не разделяю растиражированного скепсиса по отношению к белому подберезовику. Может быть, с этим грибом мне просто везло - но я никогда не находил старых, "расшляпившихся", насквозь червивых белых подберезовиков. Все, что мне попадались, были аккуратные, молодые, сочные. Не водянистые, а именно сочные. Любопытно, что фактура ножки ничем практически не отличалась от фактуры шляпки: нож входил в нее без хруста, и не оставлял взлохмаченных концов (верный признак того, что подберезовик стар и ножка у него одеревенела до невозможности). Белый подберезовик также отличается количественной благопристойностью и никогда не поставит человека перед странной дилеммой: и не брать хорошие грибы как-то глупо, и по лесу походить еще хочется. Обыкновенный же подберезовик нередко ставит грибника в тупик, вызывая довольно смешанные чувства.