



Шляпка: Диаметр 1-4 см, правильной конической формы, цвет меняется от серого до темно-серого, буроватого, нередко с фиолетовым оттенком. У менее мощных экземпляров сквозь шляпку просвечивают пластинки. Мякоть тонкая, сероватая, водянистая. Запах отсутствует.

Пластинки: Тонкие, цвета шляпки, приросшие или прикрепленные зубцом.

Споровый порошок: Черный.

Ножка: Тонкая, высотой до 15 см, полая, волокнистая, цилиндрическая, равномерно (и

незначительно) расширяющаяся в нижней части. Часто покрыта своеобразным беловато-серым налетом. Цвет неопределенно-сероватый, темный.

Распространение: Панаэолус мотыльковый встречается осенью в полях, на унавоженных пастбищах, в траве.

Сходные виды: Род *Panaeolus* в каждом источнике описывается по-своему; различий очень много. На сайте "The Fungi of California" нашли интересный выход: сославшись на работы некоего Gerhardt, упразднили похожие виды *P. campanulatus*

,
P. sphinctrinus

и
P. retirugis

, объявив их синонимами
Panaeolus papilionaceus

. Решение удачное, пусть и несколько спорное. В любом случае, отличительными чертами этого вида являются его размеры: остальные сенные навозники гораздо ниже ростом. Да и появляется он тогда, когда грибной ассортимент уже сведен к минимуму.

Съедобность: Неизвестна. Возможно, содержит псилоцибин (в малой концентрации).

Замечания автора: Удивительно крупный и правильный *Panaeolus*. Гриб-идеалист. Растет в густой спутанной траве, но не прогибается. В принципе, его можно отличить от всех остальных сородичей именно благодаря правильности форм и сообразности пропорций. И вроде сказать о нем нечего, и не нужен он никому ни за чем, и качественного снимка не получилось, а обойти вниманием и оставить неопределенным - совесть не позволяет. Хороший гриб, правильный.