



Шляпка: 3-8 см в диаметре, форма - от выпуклой до распростертой, часто с тупым центральным бугорком, подчеркнутым окраской. Цвет - от белесого до глинисто-желтого, в центре темнее; поверхность очень слизистая даже в сухую погоду, покрыта плотно прижатыми, не всегда хорошо заметными чешуйками. На краях шляпки часто остаются фрагменты паутиннистого покрывала. Мякоть шляпки светло-кремовая, у взрослых грибов часто водянистая, со слабым грибным запахом и без особого вкуса.

Пластинки: Частые, приросшие, у молодых грибов светло-глинистые, с возрастом, по мере созревания спор, приобретают ржаво-коричневый цвет. В молодости закрыты паутиннистым частным покрывалом.

Споровый порошок: Коричневый.

Ножка: 4-8 см в высоту, 0,3 - 0,8 см в толщину, цилиндрическа, нередко искривленная (в соответствии с условиями произрастания), цельная или выполненная, в основании часто утолщена. В центральной части слабо сохраняющиеся остатки частного покрывала, разделяющие ножку на две визуальные области: выше кольца она светло-кремовая, вполне гладкая, ниже покрыта крупными белыми хлопьеобразными чешуйками. Мякоть ножки жесткая, волокнистая, у основания ржаво-коричневого цвета, выше - более светлая, желтоватая.

Распространение: *Pholiota lenta* - гриб поздний, плодоносит с начала осени и до регулярных ноябрьских заморозков в хвойных и смешанных лесах, на еловых и сосновых останках, а также на почве около пней; растет группами, хотя и не такими крупными, как представители рода *Pholiota* "опеночного" типа.

Сходные виды: Очень слизистая шляпка и позднее плодоношение сами по себе являются своеобразной гарантией уникальности чешуйчатка клейкой. В то же время, насколько можно судить, существует как минимум один похожий вид чешуйчатка с мелкими, но такими же скользкими плодовыми телами, также плодоносящий довольно поздно; что с ними делать, пока неясно.

Съедобность: Чешуйчатка клейкая - гриб съедобный, но по очевидным причинам практически не востребованный ценителями грибной кулинарии.

Замечания автора: Читал о чешуйчатка клейкой давно, много о ней думал, а в жизни встречал лишь несколько раз, да и то, как выясняется, не ее - мелкую чешуйчатку или даже гебелому, растущую стайкой на опушке молодого леса, в густой и спутанной траве. Сама же чешуйчатка клейкая оказалась совсем не такая, как о ней писали. Вполне респектабельный гриб, разве что шляпка какая-то мокрая. Но это ничего, а учитывая грядущие заморозки, даже нормально. Другое дело, что забирается эта чешуйчатка в такие места, под такие елки, где ее не то что фотографировать, просто заметить-то непросто.