



Шляпка: Одиночная, диаметр 5-12 см, распростертая, округлая, в молодости с подвернутым краем. Цвет серовато-бурый, выцветает до грязно-кремового. Мякоть белая, плотная, с приятным грибным запахом.

Спороносный слой: Поры мелкие, в молодости белые, слегка нисходящие по ножке.

Споровый порошок: Белый.

Ножка: Диаметр 0,5 - 1 см, цилиндрическая, часто искривленная, очень плотная, в нижней части покрыта темными чешуйками.

Распространение: Растет с начала мая до конца лета на гниющей древесине. Надо полагать, массово встречается главным образом весной.

Сходные виды: В мае выбор шляпочнообразных трутовиков невелик, и конкурентов у этого гриба нет. А так вообще можно перепутать с трутовиком зимним, *Polyporus brumalis*. Тот какой-то более коричневый.

Съедобность: Так себе. Вишневский пишет, что это "вешенка с трубочками", но в этой довольно лестной оценке он, считай, одинок.

Замечания автора: Обратите внимание, как похож представленный на заглавном снимке гриб на плютей олений (*Pluteus cervinus*)! Встреча с этим трутовиком подарила мне несколько секунд приятнейшего недоумения.

А вообще, удивительно это стремление грибов к правильной "шляпочной" форме. Казалось бы, у природы полная свобода творчества! Так нет же, слепая эволюция упорно приходит к такому варианту: одна ножка, одна шляпка, а под шляпкой - спороносный слой. Именно такую форму диктует Высшая Целесообразность. Людям есть над чем задуматься.