



**Шляпка:** Крупная (5-12 см в диаметре, бывает и больше), мясистая, от выпуклой до полурастпростертой, часто неровная; по цвету очень изменчивая: либо зеленовато-серая, с матово-белыми краями, либо, напротив, коричневато-красноватая; окрашена неровно, переливчато, с плавными цветовыми переходами. Поверхность слегка шероховатая, бархатистая, при влажной погоде может быть немного клейкой. Мякоть толстая, беловатая, с сильным запахом хозяйственного мыла.

**Пластинки:** Редкие, широкие, приросшие, беловатые или желтоватые, при повреждении могут краснеть.

**Споровый порошок:** Белый.

**Ножка:** 4-8 см в высоту, 1-2 см в толщину, несколько утолщенная ближе к основанию, цельная, светлее шляпки. Поверхность ножки бывает покрыта волокнистыми чешуйками, но устойчивым этот признак назвать нельзя.

**Распространение:** Рядовка мыльная встречается с середины августа до конца октября в хвойных и смешанных лесах, образуя микоризу с елью и, очевидно, сосной. Растет большими группами.

**Сходные виды:** Сильный мыльный запах позволяет с большой долей уверенности отличить *Tricholoma saponaceum* от всех прочих рядовок.

**Съедобность:** Гриб несъедобен из-за сильного мыльного запаха.

**Замечания автора:** Мыльная рядовка представляет все рядовки с плохой стороны. В этом она - естественный оппонент рядовки серой, [\*Tricholoma portentosum\*](#). Та красиво растет, узнаваема с первого взгляда, приятна на ощупь и очень вкусна. Эта лезет где попало, лица собственного не имеет и ужасно воняет мылом. Единство и борьба противоположностей.