



Род: *Amanita*

Автор: (Paul. ex Vitt.) Bertillon

Статус: 3 (R). Редкий вид с дизъюнктивным ареалом

Распространение: В РСФСР встречается только в Белгородской обл., где известно несколько местонахождений в Новооскольском и Валуйском районах (1). В СССР, кроме того, встречается в Эстонии, Латвии, на Украине, в Восточной Грузии, а также в Центральном и Восточном Казахстане (2-5). Вне СССР произрастает в Западной Европе, за исключением ее северной части (6).

Экология: Микоризный гриб, симбионт дуба, бука, липы. Предпочитает карбонатные почвы. Плодоносит в июле - сентябре. Встречается в широколиственных и хвойно широколиственных лесах, в РСФСР найден только в дубравах

Лимитирующие факторы: Узкая экологическая амплитуда, ярко выраженная кальцефильность и теплолюбивость, антропогенное воздействие.

Охрана: Необходимы контроль за состоянием популяций и поиски возможных новых местонахождений.

Источники: 1. Беденко, 1980; 2. Урбонас и др., 1974; 3. Нахуцришвили, 1975; 4. Самгина, 1977; 5. Зерова и др., 1979; 6. Вав, 1961.

Составители: Э. Л. Нездоймино

