Статус. 3б. Редкий вид. Плодовое тело простое, широкобулавовидное, 7-15 см высотой, часто продольно-морщинистое, светло-жёлтое, позднее охряно-желтое, при надавливании приобретает буровато-красноватый цвет, у основания беловойлочное. Ткань плотная, губчатая, белая, на изломе медленно окрашивается в пурпурно-буроватый цвет, с приятным запахом и горьковатым вкусом.
Распространение: Первомайский р-н (окр. сёл Фирсово и Сосновка), Тальменский р-н (окр. с. Озерки), Бийский р-н (окр. г. Бийска).
Общ. распр.: Россия (Урал, Юж. Сиб., Дальн. Вост.), Евр., Казах., Сев. Амер.
Экология. На почве, обычно среди зеленых мхов, на древесных остатках, опавшей хвое в лиственных и смешанных лесах.
Биология. Встречается одиночными экземплярами или небольшими группами, редко, в августе-сентябре.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Особенности экологии и биологии вида. Изменение естественных местообитаний под действием антропогенных факторов.
Принятые меры охраны. Внесён в Красные книги СССР и РСФСР.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1988; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Красная книга

Республики Алтай, 1996; 4. Флора спор. Раст. Казахстана, 1964; 5. Кучин, 2002; 6. Горленко и др., 1980; 7. Перова, Горбунова, 2001; 8. Силантьева, Терёхина, 1997; 9. Васильева, 1972.
Составитель: Ю.А. Чубарова.