



Статус. 3. Редкий гнездящийся вид.

Распространение. Евразия от Скандинавии до долины Индигирки. В настоящее время, несмотря на значительные потери пригодных местообитаний, журавль селится во всех районах области.

Численность. На верховых болотах площадью менее 1000 га обычно гнездятся 1—2 пары, а на более крупных торфяниках численность может достигать 10 — 20 пар (Оршинский Мох, Жарковский Мох, Дерзкий Мох, Лебяжье). На низинных болотах сходных размеров численность бывает в 2—3 раза выше (Стаховский Мох, Савцинское болото, Верхнемоложский водно-болотный комплекс). ВЦЛГПБЗ гнездится около 20 пар. В целом по области плотность населения журавля на верховых болотах составляет 0,08 — 0,2 ос. на кв. км, на переходных и низинных болотах — 0,2 — 0,6 ос. на кв. км. Принимая во внимание особенности биотопической приуроченности и потенциально пригодную для гнездования журавля площадь, численность вида на болотах области можно принять в 300 — 400 пар, а с учетом птиц, поселяющихся в других угодьях, этот показатель составит около 500 пар.

Экология. Населяет различные заболоченные территории, предпочитая крупные болота. В меньшем количестве птицы гнездятся в сырых поймах рек и приозерных котловинах, на заболоченных участках лесов, вырубок, пустошей, редко на старых торфокарьерных разработках. Моногам, пары сохраняются в течение многих лет. Гнездо в виде кучи тростника, болотных трав, хвороста. В кладке 2 яйца. Питается семенами, ягодами, молодыми побегами, а также насекомыми, моллюсками, мелкими позвоночными животными (лягушками, грызунами). Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение болот, беспокойство.

Меры охраны. Гнездовья охраняются в ЦЛГПБЗ, гос-комплексе “Завидово” и ряде болотных заказников. Контроль за численностью популяции.

