



Статус. 2. Редкий вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Заселяет все континенты, кроме Антарктиды, но сплошного ареала не образует. В конце XIX века в Тверской губернии был обычен в Зубцовском и Ржевском уездах, где селился в долинах рек Волги, Вазузы, Осуги, а также на Тверце и ее притоках. В настоящее время гнездовые место-обитания на р. Вазузе исчезли в результате создания водохранилища. Отсутствуют сведения о гнездовании вида на Ивановском вдхр., где в 60-е годы гнездились 3—5 пар. Предполагается гнездование на полях фильтрации в окрестностях г. Твери. До недавнего времени гнезился в устье р. Тьмы Калининского района, но в настоящее время регулярно селится лишь выше по течению этой реки у д. Малые Борки. В 80 — 90-е гг. XX века отдельные пары регистрировались на прудах рыбхоза “Пуйга” Вышневолоцкого района, на р. Бол. Пудице Кимрского района, в окрестностях г. Кимр на р. Волге, в устье р. Жабни Калязинского района, на р. Мологе в Максатихинском районе.

Численность. Не определена, вероятно, регулярно гнездится не более нескольких десятков пар.

Экология. Гнездится на песчано-галечниковых косах и островах со скудной растительностью на реках, озерах и водохранилищах. Гнездо представляет собой небольшую ямку в грунте. В кладке 2 — 4 яйца. Питается моллюсками, личинками водных беспозвоночных. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение пойм, в т. ч. подтопление при создании водохранилищ, возрастающая рекреация и связанное с ней беспокойство птиц. Локальное негативное значение для вида могут иметь дноуглубительные работы на судоходных реках.

Меры охраны. Учет сохранившихся гнездовий, пропаганда охраны вида, создание особо охраняемых природных территорий в местах гнездовий. Материковый подвид (*Haematopus ostralegus longipes*), к которому относятся птицы из Тверской обл., включен в Красную книгу РФ.

