



**Статус.** 3. Редкий гнездящийся вид.

**Распространение.** Евразия от Голландии и Франции до Барабинской степи и западных предгорий Алтая. В Тверской обл. распространен широко, но весьма неравномерно. Небольшие поселения известны в районе Иваньковского вдхр., оз. Верестово и на прилегающих болотах (Бежецкий р-н), в поймах рек Медведицы, Торопы, Межи, Западной Двины, Туросны, Яхромы, на Оршинском Мохе и др. болотах западной части области.

**Численность.** В гнездовой период на Иваньковском вдхр. встречаемость вида составляла 0,3 — 0,4 ос. на 10 км маршрута, на низинных болотах — 0,4 ос. на кв. км. На большинстве крупных верховых болот области гнездится отдельными парами или группами из 3 — 6 пар, в редких случаях до 20 — 25 пар. В целом численность в области составляет 1000 — 2000 пар.

**Экология.** Гнездится в пойменных угодьях, на низменных берегах озер, водохранилищ, рыбопродуктивных прудов, в сырых ложбинах среди полей, пастбищ и мелиорированных земель, на осоковых низинных и переходных болотах, редко на верховых болотах. В кладке 4 яйца. Питается различными насекомыми, водными беспозвоночными и их личинками. Перелетный вид.

**Лимитирующие факторы.** Осушение болот и пойменных угодий, раннее сенокосение и перевыпас скота в местах гнездования.

**Меры охраны.** Места гнездования охраняются в ЦЛГПБЗ, госкомплексе “Завидово”, ряде болотных заказников. Запрещение сплошной распашки лугов и раннего сенокоса, весенней охоты в местах гнездования вида.

