



Статус. 3. Редкий гнездящийся вид.

Распространение. Евразия от Румынии и Венгрии до Приморья. В Тверской обл. близок к северной границе ареала, распространен спорадично. Современное гнездование установлено в окрестностях оз. Верестово Бежецкого района, гнездится в окрестностях Шошинского плеса Ивановского вдхр. и на полях фильтрации у г. Твери, в рыбхозе “Пуйга” Вышневолоцкого района и ряде других мест.

Численность. По приблизительным оценкам, численность составляет несколько сот пар. Плотность населения вида в гнездовой период в луго-болотных угодьях оз. Верестово — 0,03 — 0,19 ос. на 10 км маршрута.

Экология. Поселяется на открытых заболоченных речных поймах, низменных берегах озер и водохранилищ, рыбопродуктивных прудах, лугах, низинных, в том числе частично осушенных, болотах. Гнездовая лунка имеет слабую выстилку из сухой травы. В кладке 4 яйца. Кормится по сырым местам и мелкой воде насекомыми, их личинками и прочими беспозвоночными. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Глубокое осушение болот, интенсивная сельскохозяйственная мелиорация, распашка лугов, раннее сенокошение.

Меры охраны. Соблюдение экологических норм ведения сельскохозяйственного

производства. Недопущение сплошного глубокого осушения пойм. Создание особо охраняемых природных территорий в местах гнездования .

