



Статус. 3. Редкий гнездящийся вид.

Распространение. Евразия от Атлантического до Тихо-океанского побережья (1). Встречается по всей территории области, но весьма спорадично. Гнездование и летнее пребывание птиц известно в районе оз. Верестово (Бежецкий район), оз. Великое (Рамешковский район), на островах и побережьях Шошинского плеса Иваньковского водохранилища, на низинных болотах: Савцинское (Кесовогорский район), Стаховский Мох (Нелидовский район), Балашов Лог (Лихославльский район), на полях фильтрации у г. Твери, у пос. Эммаус (2), д. Бerezай Спировского района (3), а также на грядово-мочажинных комплексах верховых болот Дерзкий Мох (Андреапольский район) и Шейкинский Мох (Жарковский район) и в ряде других мест.

Численность. Гнездится отдельными парами или небольшими группами. В пойменно-луговых угодьях оз. Верестово плотность населения в гнездовой период составляет до 4,0 ос. на кв. км. Общая численность приблизительно оценивается в 500—1000 пар.

Экология. Гнездится в поймах рек, на лугах, пастбищах, низинных, изредка на верховых болотах, мелиорированных сельхозугодьях, старых торфоразработках. Гнездо устраивает на кочке или дерновине. В кладке 4 яйца. Питается различными водными и наземными беспозвоночными. Перелетный вид (4).

Лимитирующие факторы. Вид в состоянии адаптироваться к сенокосению и умеренному выпасу скота, особенно проводимых в традиционных формах, но исчезает с

мест гнездовий в результате глубокого осушения болот и мелиорации сельхозугодий.

Меры охраны. Основным звеном в охране вида служат болота, включенные из планов хозяйственного освоения. Соблюдение экологических норм ведения сельского хозяйства, в том числе сохранение участков болотной растительности, недопущение сплошного глубокого осушения пойм и спрямления русел малых рек.

