



Статус. 2. Редкий вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Евразия от Скандинавии и Дании до долины Енисея. Встречается в большинстве районов области, но с очень низкой численностью. Гнездование известно на Верхней Мологе, в районе оз. Верестово, на Савцинском низинном болоте и в пойме р. Яхромы (Кашинский, Кесовогорский районы), на прибрежных лугах оз. Великое (Рамешковский район), Стаховском Мохе (Нелидовский район), в Фировском и Вышнево-лоцком районах, в районе Шошинского плеса Иваньковского вдхр., в окрестностях г. Твери и ряде других мест.

Численность. В XX столетии (особенно с 50-х гг.) отмечается резкий спад численности дупеля. Ранее гнезился в большом количестве на Верхней Мологе, Волго-Шошинской низине, в Приселигерье. В настоящее время в подходящих биотопах встречаемость вида составляет в среднем 0,03 ос. на 10 км маршрута.

Экология. Гнездится на пойменных и суходольных лугах, чередующихся с заболоченными ложбинами, на луговых островах среди низинных и верховых болот. Полигам, характерно ярко выраженное токовое поведение. В кладке 4 яйца. Питается личинками насекомых, дождевыми червями и другими беспозвоночными. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Проведение крупномасштабных мелиоративных работ и распашка пойменных угодий, раннее сенокошение, натаскивание охотничьих собак в

местах гнездования , отстрел в период токования.

Меры охраны. Учет мест гнездования птиц и организация особо охраняемых природных территорий, запрещение весенней охоты, перенос сенокосения в местах гнездования на более поздние сроки (на июль) и регламентация пастбищной нагрузки.

