



Статус. 3. Редкий гнездящийся вид.

Распространение. Южная часть лесной, лесостепная и степная зона Евразии от Венгрии до Приморья. В Тверской обл. встречается в районе оз. Верестово и прилегающих к нему водно-болотных угодьях Верхней Мологи, Ивановского вдхр. Отдельные поселения известны в низовьях р. Шоши, на оз. Соломинское близ г. Торопца и на оз. Селигер.

Численность. Характерны значительные межгодовые колебания численности, вплоть до полного прекращения гнездования в отдельных поселениях. В благоприятные годы на оз. Верестово в одной колонии насчитывалось около 50 пар, на Шошинском плесе Ивановского вдхр. — до 50 пар, в низовьях р. Шоши — около 20 пар.

Экология. Населяет заболоченные поймы рек, низменные берега и острова водоемов, обводненные низинные болота. Образует смешанные поселения с другими видами чайковых птиц. Гнезда помещаются на кочках, сплавинах, илистых отмелях, плавающей растительности. В кладке обычно 3 яйца. Питается водными беспозвоночными и насекомыми, реже мальками рыб. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Осушение пойм и болот.

Меры охраны. Запрещение осушительно-мелиоративных работ в местах гнездовий.

Охраняется в госкомплексе “Завидово” и на болотах, исключенных из планов хозяйственного освоения.

