



**Статус.** 2. Редкий вид, сокращающийся в численности.

**Распространение.** Евразия от Атлантического до Тихо-океанского побережья. В Тверской обл. распро-странен довольно широко, в т.ч. в нижнем течении р. Шоши и на р. Тьме (Калининский район), р. Корожечне ( Сонковский, Кесовогорский, Кашинский районы), на реках Цне и Шегре (Фировский, Вышнево-лоцкий районы), р. Кунье и ее притоках (Торопецкий район), р. Западной Двине (Западновинский район), р. Меже ( Жарковский район), на р. Волге в районе устья р. Орши, особенно на верхнем участке р. Волги от пос. Селижарово до г. Ржева, на р. Съезка (Удомельский р-н)

**Численность.** В XX в. численность заметно сократилась . В целом по области в настоящее время обитает не более нескольких десятков пар.

**Экология.** Гнездится в норах по обрывистым берегам лес-ных речек и ручьев с прозрачной водой. Моногам с частыми случаями полигамии. В сезоне 1—2 кладки из 5—8 яиц. Питается мелкой рыбой и водными бес- позвоночными. Перелетный вид .

**Лимитирующие факторы.** Служит чутким индикатором состояния речных экосистем, исчезает в результате за - стройки берегов и загрязнения водоемов, беспокойства и раскапывания гнездовых нор.

**Меры охраны.** Выявление мест гнездования, создание особо охраняемых природных территорий в долинах малых рек. Пропаганда охраны вида.

