



**Статус.** 3. Редкий гнездящийся вид.

**Распространение.** Евразия от Атлантического до Тихоокеанского побережья, Африка. В Тверской обл. в гнездовое время встречен в Калининском районе в окрестностях деревень Дуденево, Бойково, Ферязкино и Титово, в г. Твери, в Рамешковском районе в окрестностях д. Медведиха, в Бежецком районе у д. Чижово, в окрестностях г. Весьегонска и г. Торопца, отмечен у оз. Дербиш и в пойме р. Велесы (Западно-двинский район), в пойме р. Туросны, у оз. Щучьего (Жарковский район) и болота Стаховский Мох (Нелидовский район). По данным опроса, вид изредка встречается в Андреапольском, Пеновском, Осташковском, Фировском, Бологовском, Ржевском и Весьегонском районах.

**Численность.** Повсеместно низка, подвержена резким годовым колебаниям.

**Экология.** Встречается в сходных с сизоворонкой станциях. Гнездится по окраинам лесов и в рощах, среди сельхозугодий, в речных поймах, вдоль дорог, на окраинах населенных пунктов. Гнезда устраивает в дуплах, в постройках человека. В кладке 3—9 яиц. Питается насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Перелетный вид.

**Лимитирующие факторы.** Естественная редкость вида у границ ареала. Беспокойство и случайное разорение гнезд.

**Меры охраны.** Сохранение дуплистых деревьев, контроль за состоянием и пропаганда охраны вида.

