Статус. 4. Неопределенный по статусу вид.

Распространение. Лесная и степная зоны Евразии, Северная Америка. Гнездовой ареал состоит из нескольких изолированных участков . В Тверской обл. гнездование известно в Вышневолоцком районе. Достоверно гнездилась на оз. Шлино, где были найдены две кладки . В 90-х гг. птиц отмечали на прудах Кашинского района, а также на прудах рыбхоза у д. Азарниково Калининского района . Приводится для Пеновского района . вида являются некоторые водно-болотные угодья в Бежецком и Вышневолоцком районах . Известны встречи поганок на озерах Нелидовского (Щ1ГПБЗ) и Бологовского (оз. Черное) районов . В литературе приводится для оз. Серемо Осташковского района . Численность. В целом по области обитает не более нескольких десятков пар.

Численность. Не определена, вероятно, гнездится единичными парами и не ежегодно.

Экология. Поселяется на неглубоких водоемах с развитой прибрежно-водной растительностью, тростниковыми островками и сплавинами. Гнездо сооружает на плавающих растениях. В кладке 3 — 6 яиц. Основу питания составляют мелкая рыба и водные насекомые. Перелетный вид .

Лимитирующие факторы. Неясны. Возможно, чрез мерное воздействие на водно-болотные угодья осушительной мелиорации и загрязнения, а также ограниченное количество подходящих для гнездования мелководных, эвтрофных водоемов в области.

Меры охраны. Выявление и охрана мест обитания.