



Статус. 0. Вид, переставший гнездиться в области.

Распространение. Евразия от Скандинавии до Нижнего Амура . В XIX первой половине XX вв. отдельные пары гнездились на территории Вышневолоцкого, Бологовского, Нелидовского районов, в окрестностях пос. Тургиново Калининского района . Выводок из 5 особей был отмечен в 1979 г. на оз. Шитовское Вышневолоцкого района . Летние встречи гусей известны в пойме р. Мологи (Максатихинский район), на болотах Костеневская Гарь (Кашинский район) и Сосновская Низина в низовьях р. Инюхи (Конаковский район), на водоемах Жарковско-Свитской болотной системы (Жарковский, Западновинский и Нелидовский районы) и ряде других мест.

Численность. Возможно нерегулярное гнездование отдельных пар. Во время сезонных миграций на долю вида приходится не более 1% общей численности гусей .

Экология. Предпочитает заросшие тростником озера с болотистыми, труднопроходимыми берегами. В кладке 4—6 яиц. Во время линьки теряет способность к полету. Питание главным образом составляют молодые побеги и семена. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Охота, особенно весенняя. Сильное беспокойство птиц в весенне-летний период, браконьерский отстрел, трансформация водно-болотных угодий в результате осушительной мелиорации.

Меры охраны. Запрет весенней охоты. Привлечение на гнездование при соблюдении строгой охраны, создание заказников.

