



Статус. 2. Редкий вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Тундровая и бореальная зоны Евразии от Атлантического до Тихоокеанского побережья и Северная Америка. В настоящее время продолжает встречаться во всех районах области кроме Кона-ковского, Кашинского и Калязинского, где этот вид не регистрируется на гнездовье последние 10 — 20 лет. Близок к исчезновению в Ржевском, Зубцовском, Кесовогорском, Сонковском и Краснохолмском районах. Отдельные птицы еще появляются на прилегающих к Ивановскому вдхр. торфоразработках и болотах, но их постоянное обитание здесь маловероятно. Основные очаги обитания белой куропатки приурочены к верховым массивам валдайской части области, в первую очередь, к Жарковско-Свитской болотной системе (Жарковский, Вельский, Западновинский, Нелидовский районы), болотам Приселигерья (Осташковский, Пеновский, Селижаровский, Андреапольский районы), Терелесовогрядской болотной системе (Вышневолоцкий, Спировский районы), болотам Верхней Мологи (Лесной, Максатихинский районы). На востоке области последнее крупное местообитание вида находится в неосвоенной части Оршинского Моха (Калининский, Рамешковский районы).

Численность. Резкое падение численности куропатки произошло в 60 — 70-х годах. По данным анкетного учета 1959 — 1962 гг., на большей части области (за исключением юга и юго-востока) вид был еще достаточно обычным, но к 80-м годам стал редким почти повсеместно. Плотность населения вида в подходящих биотопах в гнездовой период составляет в среднем 0,5—1,0 ос. на кв. км, а на некоторых болотных массивах — до 4,0 ос. на кв. км. ВЦЛГПБЗ на болоте Катин Мох обитает до 20 — 30 пар (4). В целом в области численность вида оценивается в 500—1000 пар.

Экология. Гнездится исключительно на верховых болотах. Осенью откочевывает в ивняковые заросли по краям болот, на вырубке, поймы речек и ручьев, гари, старые торфокарьерны е разработки. Моногам. Гнездо на земле. В кладке 8—12 яиц. Питается почками, листьями, побегами, ягодами, реже поедает насекомых. Оседлый вид.

Лимитирующие факторы. Сокращение местообитаний в результате осушения и разработки болот, возможно, климатические изменения.

Меры охраны. В области обитает среднерусская белая куропатка (*Lagopus lagopus rossicus*), включена я в Красную книгу РФ. Гнездовья охраняются в ЦЛГПБЗ и ряде болотных заказников. Пропаганда охраны вида.

