



Статус. 4. Неопределенный по статусу вид.

Распространение. Циркумбореальный ареал, охватывающий таежную зону. В европейской части ареала имеет горные изолированные популяции. В Тверской области отмечается во всех районах. Тяготеет к территориям, мало освоенным человеком.

Численность. В Центральном-Лесном заповеднике численность 0,1—0,3 пары на кв. км.

Экология. В Тверской области населяет спелые леса бореального типа. В других частях ареала встречается и в смешанных лесах. Предпочитает гнездиться по соседству с открытыми пространствами: вырубками, открытыми моховыми болотами и поймами. Гнездится в дуплах черного дятла, а также в искусственных дуплянках. Полные кладки — в первой декаде мая. Плодовитость варьирует в зависимости от кормовой базы. В “урожайные” на мышевидных грызунов годы в кладке до 8 яиц. Основу питания составляют мышевидные грызуны и лесные воробьиные птицы. В снежный период доля птиц в рационе значительно возрастает. Известны случаи запасания корма в дуплах. В осенний период откочевывает в западном и юго-западном направлениях.

Лимитирующие факторы. Предположительно отсутствие удобных мест для гнездования и интенсивное хозяйственное освоение экосистемы тайги.

Меры охраны. Сохранение участков коренной тайги бореального типа; развешивание искусственных дупля-нок.

