



Статус. 2. Редкий вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Евразия на восток до долины Верхней Оби и Западного Алтая, Северо-Западная Африка. В Тверской обл. большинство находок вида относится к долине р. Зап. Двины и ее притокам (Западнодвинский, Жарковский, Торопецкий районы, изредка встречается в Андреапольском районе). В других частях области сизоворонки отмечались значительно реже: в нескольких пунктах Калининского, Старицкого, Осташковского районов, в окрестностях пос. Сандово, в долине р. Шегры Вышневолоцкого района. По опросным данным, в гнездовой период регистрировалась в Бологовском, Кона-ковском, Фировском, Пеновском, Ржевском, Зубцовском и Лихославльском районах.

Численность. Подвержена резким колебаниям. В последние годы численность резко снизилась, не превышает нескольких десятков пар.

Экология. Встречается в основном по опушкам сосновых лесов, в поймах рек, среди сельхозугодий, нередко вблизи населенных пунктов. Необходимым условием для гнездования является присутствие дуплистых деревьев рядом с открытыми биотопами, где птицы собирают корм. Одно дупло может использоваться несколько лет подряд. В кладке 3 — 6 яиц. Питается крупными насекомыми и мелкими позвоночными. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Изменение климата. Уничтожение старых дуплистых деревьев, пригодных для гнездования.

Меры охраны. Пропаганда охраны вида, учет и охрана мест гнездовий.

