



Статус. 2. Редкий вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Евразия от Атлантического до Тихо-океанского побережья. В Тверской обл. распро-странен довольно широко, в т.ч. в нижнем течении р. Шоши и на р. Тьме (Калининский район), р. Корожечне (Сонковский, Кесовогорский, Кашинский районы), на реках Цне и Шегре (Фировский, Вышнево-лоцкий районы), р. Кунье и ее притоках (Торопецкий район), р. Западной Двине (Западновинский район), р. Меже (Жарковский район), на р. Волге в районе устья р. Орши, особенно на верхнем участке р. Волги от пос. Селижарово до г. Ржева, на р. Съезка (Удомельский р-н)

Численность. В XX в. численность заметно сократилась . В целом по области в настоящее время обитает не более нескольких десятков пар.

Экология. Гнездится в норах по обрывистым берегам лес-ных речек и ручьев с прозрачной водой. Моногам с частыми случаями полигамии. В сезоне 1—2 кладки из 5—8 яиц. Питается мелкой рыбой и водными бес- позвоночными. Перелетный вид .

Лимитирующие факторы. Служит чутким индикатором состояния речных экосистем, исчезает в результате за - стройки берегов и загрязнения водоемов, беспокойства и раскапывания гнездовых нор.

Меры охраны. Выявление мест гнездования, создание особо охраняемых природных территорий в долинах малых рек. Пропаганда охраны вида.

