



Статус. 3. Редкий гнездящийся вид.

Распространение. Евразия от Атлантического до Тихоокеанского побережья, Африка. В Тверской обл. в гнездовое время встречен в Калининском районе в окрестностях деревень Дуденево, Бойково, Ферязкино и Титово, в г. Твери, в Рамешковском районе в окрестностях д. Медведиха, в Бежецком районе у д. Чижово, в окрестностях г. Весьегонска и г. Торопца, отмечен у оз. Дербиш и в пойме р. Велесы (Западно-двинский район), в пойме р. Туросны, у оз. Щучьего (Жарковский район) и болота Стаховский Мох (Нелидовский район). По данным опроса, вид изредка встречается в Андреапольском, Пеновском, Осташковском, Фировском, Бологовском, Ржевском и Весьегонском районах.

Численность. Повсеместно низка, подвержена резким годовым колебаниям.

Экология. Встречается в сходных с сизоворонкой станциях. Гнездится по окраинам лесов и в рощах, среди сельхозугодий, в речных поймах, вдоль дорог, на окраинах населенных пунктов. Гнезда устраивает в дуплах, в постройках человека. В кладке 3—9 яиц. Питается насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Естественная редкость вида у границ ареала. Беспокойство и случайное разорение гнезд.

Меры охраны. Сохранение дуплистых деревьев, контроль за состоянием и пропаганда охраны вида.

