



Статус. 3. Редкий гнездящийся вид.

Распространение. Зона широколиственных, смешанных и южнотаежных лесов Евразии. В Тверской обл. распространен спорадично. Относительно регулярно встречается в островной части Шошинского плеса Иваньковского вдхр., а также в окрестностях д. Ферязкино (Калининский район). Отмечался в елово-широколиственных лесах в поймах р. Чернейки (Жарковский район) и р. Сонки (Осташковский район), в черноолыпаниках у оз. Шлино (Фировский район), в окрестностях Вышнего Волочка и на побережье оз. Тишидра (Вышневолоцкий район). Отмечался в Спировском районе, г. Твери, в окрестностях д. Стан Лихославльского района.

Численность. Не определена. Плотность населения в гнездовой период в смешанных лесах ЦЛГПБЗ составляет 1,0 ос. на кв. км, а в заболоченных бере-резняка х с примесью осины у д. Ферязкино в сентябре — октябре — 0,7-0,8 ос. на кв. км .

Экология. Встречается в сырых смешанных и листвен-ных лесах в поймах рек, по краям низинных болот, берегам и островам водохранилищ, в старых рощах и парках с обильным сухостоем. Дупла обычно делает в сухих березовых и ивовых

стволах. В кладке 4 — 6 яиц. Питается насекомыми и их личинками. Оседлая и кочующая птица.

Лимитирующие факторы. В целом несущественны. Негативно на состоянии вида отражается вырубка пойменных лесов.

Меры охраны. Выявление и охрана гнездовых биотопов вида. Сохранение пойменных лесов. Места обитания охраняются в ЦЛГПБЗ и госкомплексе “Завидово”.

