



Статус.3. Редкий гнездящийся вид.

Распространение. Таежная зона Евразии и Северной Америки. В Тверской обл. регистрируется преимущественно в западной части. В гнездовой период найден на верховых болотах Заказник (Фировский район), Альфимовское (Вышневолоцкий район), Удачное (Андреапольский район) и Жарковский Мох (Жарковский район). На последнем болоте гнездование вида известно с первой половины XX в. Дупло с птенцами дятла найдено в окрестностях пос. Гузятно Болотовского района. Гнездится в ЦЛГПБЗ. Отмечался в окрестностях д. Дятлово (Вышневолоцкий район) и д. Ферязкино (Калининский район), а также в Селижаровском районе. По опросным сведениям, встречается в Максатихинском, Спировском и Кувшиновском районах.

Численность. В ЦЛГПБЗ плотность населения вида в разных биотопах составляла 1,0 — 2,5 ос. на кв. км, в декабре — марте на верховом болоте у д. Дятлово Вышневолоцкого района — 2,4 ос. на кв. км.

Экология. Населяет хвойные и смешанные леса, особенно участки с сухостоем по краям и на “островах” верховых болот, а также переходные березово-сосновые болота, гари, старые вырубki, ветровалы. Дупла чаще устраивает в елях на высоте 1 — 5 м. В кладке 3 — 5 яиц. Оседло-кочующий вид.

Лимитирующие факторы. Естественная редкость вида у границ ареала. Интенсивные лесозаготовки, вырубка еловых лесов.

Меры охраны. Необходим специальный учет гнездовых.

