



Статус. 2. Редкий вид, сокращающийся в численности.

Распространение. Евразия, Северная Африка, Северная Америка. В Тверской обл. в прошлом встречался довольно широко. В последние годы взрослые птицы и выводки отмечены на верховых болотах преимущественно в западной части области: Жарковский Мох (Жарковский район), Дерзкий Мох (Андреапольский район), Катин Мох в ЦЛГПБЗ, в неосвоенной части Оршинского Муха (Рамешковский, Калининский районы), а также в Западнодвинском районе и на старых торфоразработках Осеченского болота (Вышневолоцкий район). Во внегнездовое время встречается на побережье Шошинского плеса Ивановского вдхр., в Калининском, Спиловском, Фировском и других районах.

Численность. Резко сократилась в середине XX в., в настоящее время очень низка.

Экология. Гнездится на крупных верховых болотах. В прошлом селился и за пределами болот: в кустарниковых поймах, на зарастающих вырубках и лесных опушках. Гнездо свито из тонких веточек и стеблей травы с примесью шерсти и перьев, помещается невысоко на болотных соснах. В кладке 5—6 яиц. Питается крупными насекомыми и мелкими позвоночными. Оседлая и кочующая птица.

Лимитирующие факторы. Осушение болот и торфоразработки. Причины исчезновения внеболотных популяций неясны.

Меры охраны. Выявление и охрана современных мест гнездования вида. Специальные исследования состояния вида в области. Охраняется в ЦЛГПБЗ и ряде болотных заказников. Популяция центра европейской части России (**обыкновенный серый сорокопут** — *Lanius excubitor* L.) включена в Красную книгу Р Ф.

