



**Статус.** 5. Редкий расселяющийся вид, численность которого постепенно возрастает.

**Распространение.** Евразия от Атлантического побережья до Алтая. В Тверской обл. поселения дроздовидной камышевки зарегистрированы на старых торфяных разработках Озерецких болот и Чистого Мох, на побережье Шошинского плеса Ивановского вдхр. (Конаковский район), на рыбопроизводных прудах в низовьях р. Шоши в Калининском районе, на Оршинском Мохе (включая оз. Великое), на торфоразработках Терелесовогрядского и Осеченского болот (Вышневолоцкий район), на побережье Вышневолоцкого вдхр. В небольшом количестве селится на прудах рыбхоза “Пуйга”, в Вельском и Академическом песчано-гравийных карьерах (Вышневолоцкий район), в окрестностях д. Тараки (Удомельский район), на низинном болоте Стаховский Мох (Нелидовский район), на оз. Селигер и оз. Верестово с прилегающими к нему водно-болотными угодьями, на р. Лазури в черте Твери и в ряде других мест.

**Численность.** Судя по возросшему числу встреч, в последние десятилетия численность местной популяции вида заметно увеличилась.

**Экология.** Населяет заросли жесткостебельной растительности, особенно тростники на различных водоемах, низинных болотах, торфоразработках. Образует поселения из 5 — 10 пар. Гнезда прикрепляются к стеблям тростника над водой. В кладке 3 — 6 яиц. Перелетный вид.

**Лимитирующие факторы.** Способна в определенных пределах адаптироваться к нарушенным хозяйственной деятельностью местообитаниям. К числу негативных воздействий относится трансформация крупных водно-болотных угодий в результате осушительной мелиорации и добычи торфа.

**Меры охраны.** Специальные меры охраны не предусмотрены. Контроль за состоянием вида. При необходимости организация в местах ООПТ.

