



Статус. 5. Редкий вид, численность которого постепенно возрастает.

Распространение. Северная часть Евразии от Швеции до Чукотки и Камчатки. В Тверской обл. гнездование вида регистрируется с 1982 г. В настоящее время расселяется в основном в западной части области по верховым и переходным болотам вдоль Валдайской гряды. Выводки овсянок отмечались на Федяйковско-Железняковском (Лесной район), Святовском (Максатихинский район), Гладко-Подлипском (Фировский район), Усодицком (Западнодвинский район), Коммунарном (Бологовский район) и других болотах. Обитание вида установлено в заболоченных березняках вокруг г. Вышнего Волочка, на северном побережье Шошинского плеса Ивановского вдхр., на старых торфяных карьерах Озерецких болот в Конаковском районе.

Численность. В целом в области низка, однако в оптимальных биотопах значительно возрастает. Плотность поселения в гнездовой период в сосновом мелколесье верховых болот и сфагновых сосняках ЦЛГПБЗ составляет 17 — 18 ос. на кв. км (3).

Экология. Гнездится в сырых смешанных и березовых лесах по краям и на “островах” болот, в болотном мелколесье, на старых торфоразработках. Гнездо помещает на земле у оснований кочек, в корнях деревьев, под валежником. В кладке 4 — 5 яиц. Питается насекомыми и семенами. Перелетный вид.

Лимитирующие факторы. Выяснены слабо, вероятно, сказывается естественная редкость вида у южных границ своего распространения. Способна в определенной мере адаптироваться к трансформированным болотным место-обитаниям.

Меры охраны. Контроль за состоянием вида. Места гнездовой охраняются в ЦЛГПБЗ и госкомплексе “Завидово” .

