



**Статус.** 3. Редкий вид.

**Распространение.** От Южной Англии, Восточной Франции на западе до Северного Прибайкалья и Южного Забайкалья на востоке. Северная граница в Ленинградской обл.; заходит местами за 60° с. ш., постепенно сокращаясь к востоку примерно до 52° с. ш. в Восточной Сибири; на юго-востоке — до Монголии и Западного Китая; южная граница проходит по Балканскому полуострову, через Турцию и Иран. В Тверской обл. встречается во всех районах, но неравномерно, по участкам с благоприятными условиями.

**Численность.** Малочисленна. На 1 км маршрута — от 0,5 до 5 особей, в местах концентрации этот показатель выше.

**Экология.** Встречается в разреженных хвойных (чаще сосновых) и лиственных лесах, на просеках, лесных полянах и вырубках, на лугах, в садах, по обочинам дорог, придерживаясь хорошо освещаемых и прогреваемых участков. Питается преимущественно насекомыми (жуки, прямокрылые, двукрылые, бабочки, клопы, стрекозы, перепончатокрылые), а также многоножками, пауками, земляными червями, моллюсками. После зимней спячки появляется в конце апреля—мае, через некоторое время приступает к размножению. После спаривания самка откладывает 6—12 яиц; кладку размещает в ямках, норках, засыпая их землей, песком, растительной трухой. Развитие продолжается около 2 месяцев. Молодые особи появляются в июне—августе. Половозрелыми они становятся обычно после второй зимовки.

**Лимитирующие факторы.** Неблагоприятные условия в период размножения (прохладное, дождливое лето) и зимовки (малоснежные, морозные зимы). Близ сельхозугодий — отравление пестицидами, химическими удобрениями.

**Меры охраны.** Необходимо проведение полевых исследований по выявлению мест с большой концентрацией ящериц. Организация в таких местах заказников, в которых запрещается применение пестицидов.

