По содержанию ядовитых и токсических составляющих **мухомор вонючий** наиболее близок к бледной поганке. И многие неопытные грибники и частные обыватели ошибочно подразумевают именно его говоря о поганке. Действительно, именно этот мухомор наиболее точно подходит к названию «бледная поганка». И хотя разницы, если сравнивать их ядовитость нет, мухоморами вонючими травятся крайне редко, внешний вид и запах этих грибов, в лучшем случае, настораживает.

Шляпка **мухомора вонючего** безупречно белого цвета. В молодости имеет общее покрывало. Закрывающее пластинки и какую то часть ножки. Со временем саван разрывается, и шляпка приобретает коническую или распростертую форму. Гриб редко дорастает до 8 -10 сантиметров по диаметру шляпки. Пластинки гименофора отличаются хрупкостью, частые и ровные, не ломая общей зрительной картины тоже белые. ножка крепкая и плотная, белая с хорошо различимыми пластинкам и чешуйками, под самой шляпкой прячется растрепанное кольцо – остаток общей защитной оболочки. У основания ножка заметно утолщена и прячется в вольву, зачастую скрытую в подстилке. Мякоть белая и плотная, с неприятным запахом подгнивших корнеплодов.

Гриб встречается на всей территории бывшего СССР, но, благо, не часто. Предпочитая ель как дерево –хозяина, с которым мухомор вонючи образует микрозу, растет во всех видах лесов. гораздо реже его можно встретить и в чистых лиственных лесах, но это, скорее, исключение, чем закономерность.

Мухомор вонючий сложно спутать с другими, однако есть вероятность принять его за поплавок белый, однако ножка его лишена кольца, а край шляпки имеет ребристую структуру. В некоторых источниках упоминаются и зонтики, однако стоит на них

посмотреть, и в вероятность того, что на их месте может быть мухомор вонючий как то слабо верится.

Растет этот гриб, как и все ему родственные мухоморы с середины лета, до глубокой осени.