



Шляпка: Диаметр 1-3 см, почковидной формы, ножка крепится с краю. Поверхность шерстистая, сухая, нередко с явно выраженной зональностью. Цвет варьирует от коричневого до серого и почти черного. Мякоть жесткая, серо-коричневого цвета.

Спороносный слой: Споры образуются на нижней стороне шляпки, покрытой крупными коническими шипиками. Цвет спороносного слоя у молодых грибов коричневатый, с возрастом приобретает серый оттенок.

Споровый порошок: Белый.

Ножка: Боковая или эксцентрическая, достаточно длинная (5-10 см) и тонкая (не более

0,3 см в толщину), темнее шляпки. Поверхность ножки бархатистая.

Распространение: Аурискальпиум обыкновенный растет с начала мая до глубокой осени в сосновых и (реже) в еловых лесах, всему на свете предпочитая сосновые шишки. Встречается часто, но не особо обильно, с довольно ровным распределением по местности.

Сходные виды: Гриб уникален.

Съедобность: Отсутствует.

Замечания автора: *Auriscalpium vulgare* - типичный пример "технического гриба". Это - работник сцены, который напрямую со зрителями не контактирует. Все те, кто интересуется механикой этого театра, знают гриб в лицо, остальные же и не подозревают, что прямо у них под ногами можно встретить такое чудо.