



Плодовое тело: Форма дисковидная или блюдцевидная, жилковатая, часто неправильная, сильно волнистая. Диаметр шляпки 4-15 см. Цвет варьирует от коричневого до розовато-оливкового. Нижняя поверхность грязно-белая или серая, с явно выступающими жилками. Мякоть ломкая, тонкая, беловатая или серая, со слабым грибным запахом и вкусом.

Ножка: Короткая (до 1 см), жилковатая, не отделяется от нижней поверхности шляпки.

Споровый порошок: Белый.

Распространение: Попадает с начала мая до середины лета (массовый выход, как

правило, приходится на середину или конец мая) в лесах различного типа, в парках, часто располагаясь около гниющих остатков деревьев или прямо на них. Предпочитает, очевидно, древесину хвойных пород.

Сходные виды: В тех же местах и в то же время растет также Дисцина жилковатая (*Discina venosa*

). Встречается она, очевидно, несколько реже Дисцины щитовидной.

Съедобность: Считается съедобным грибом не самого высокого качества - что-то на уровне строчка обыкновенного (*Gyromitra esculenta*).

Замечания автора: Чем этот гриб интересен - так это тем, что появляется на полном безгрибье (по крайней мере, в "наших" местах), и тем самым привлекает к себе повышенное внимание. Надо признать, что заросли крупных сочных дисцин производят всесторонне приятное впечатление - особенно если они оказываются единственным видом грибов, найденным в результате многочасовых поисков. Может быть, хорошее впечатление связано и с благородной окраской плодовых тел, наводящей на мысли о белом грибе. Так или иначе, гриб сам просится в мешок, и даже справедливые предупреждения о низкой его ценности, без которых не обходится ни одно описание, пропадают, как правило, впустую.