Шляпка: Диаметр 4-10 см, желто-оранжевая, выцветающая, форма плоско-выпуклая, иногда воронковидная, с завернутым краем. Поверхность сухая, бархатистая. Мякоть бело-желтая, в центре толстая, вязкая, без особого запаха и вкуса.

Пластинки: Оранжевые, частые, разветвленные, нисходящие на ножку.

Споровый порошок: Беловатый.

Ножка: Длина 4-6 см, толщина 0,5-1 см, цилиндрическая, полая, цвета шляпки.

Распространение: Оранжевая говорушка растет с июля до октября в хвойных лесах, на пнях и остатках корней. В августе-сентябре Встречается относительно часто.

Сходные виды: Считается, что *Hygrophoropsis aurantiaca* просто-таки неотличима от *Cantharellus cibarus*
, лисички настоящей. Не знаю даже, что тут сказать. На мой взгляд, эти грибы не перепутает и слепой - настолько различается их фактура.
Hygrophoropsis aurantiaca
ощупью похожа на свинушку тонкую,
Paxillus involutus
, в то время как лисичка похожа на плохую резину. О чем тут еще говорить?

Съедобность: Считается условно-съедобным грибом низкого качества. Требует продолжительной обработки. В одной книге указано, что гриб ядовит: вызывает *боли и галлюцинации.*

Замечания автора: Я понимаю, что рискую прослыть шовинистом, но все представители семейства Paxillaceae, с которыми свела меня жизнь, не вызывали у меня сколь-нибудь существенной симпатии. Ну, грибы себе и грибы. Таких много. Что свинушки тонкие (
Paxillus involutus
), что говорушки оранжевые, они же лисички ложные. Очень уж они какие-то обычные. Впрочем, исчезни они все вдруг разом - неизвестно, как бы они тогда воспринимались. Доступность развращает.