



Шляпка: Диаметр 3-6 см. В молодости, когда пластинки затянуты частным покрывалом, форма полушаровидная, затем шляпка раскрывается до полураспростертой; в центре часто сохраняется характерный бугорок. Окраска неровная, всех оттенков желтого и бурого цвета, в центре часто темнее. Мякоть тонкая, желтовато-зеленоватая, с грибным запахом и горьким вкусом.

Пластинки: Приросшие, частые, узкие и тонкие; в молодости (под белым покрывалом) нежного желто-зеленоватого цвета, с возрастом значительно темнеют.

Споровый порошок: Фиолетово-коричневый.

Ножка: Высота 3-8 см, толщина до 0,5 см (обычно тоньше), полая, цвета шляпки, в

нижней части темнее; кольцо обычно незаметно - остатки частного покрывала равномерно распределяются по краям шляпки.

Распространение: *Hypholoma fasciculare* повсеместно встречается с конца мая до поздней осени на гниющей древесине, предпочитая лиственные породы. Как правило, растет большими группами.

Сходные виды: Зеленоватый цвет пластинок и шляпки позволяет отличить этот гриб от большинства так называемых "опят". Опенк серопластинчатый (*Hypholoma capnoides*) растет на сосновых пнях, пластинки у него не зеленоватые, а серые.

Съедобность: Гриб несъедобен или слабо ядовит; в любом случае, горький вкус и общая неприглядность лишают всякой интриги возможные эксперименты в этом направлении.

Замечания автора: Я полагаю, что на конкурсе самых невзрачных грибов опенку (или ложноопенку) серно-желтому никогда не выиграть главный приз: не получится привлечь внимание жюри.