



Шляпка: Диаметр от 2 до 8 см, желто-бурого цвета, сильно гигрофанная, в центре более светлая (в сухую погоду зональность окраски не так сильно выражена, иногда вообще отсутствует), сначала выпуклая с бугорком в центре, затем плоско-выпуклая, в сырую погоду клейкая. Мякоть тонкая, светло-бурая, с приятным запахом и вкусом. Нередко случается, что шляпки грибов "нижнего яруса" покрываются коричневым слоем спорового порошка от верхних грибов, и создается впечатление, будто бы они гнилые.

Пластинки: Сначала светло-желтые, затем ржаво-бурые, приросшие к ножке, иногда слабо нисходящие.

Споровый порошок: Темно-коричневый.

Ножка: Длина 3-8 см, толщина до 0,5 см, полая, цилиндрическая, изогнутая, жесткая, коричневая, с бурым пленчатым кольцом, ниже кольца темно-бурая.

Распространение: Растет с июня по октябрь (обильно плодоносит, как правило, в июле-августе, не позже) на гниющей древесине, на пнях и валежнике лиственных деревьев, преимущественно березы. При подходящих условиях попадает в огромном количестве. На хвойных деревьях встречается редко.

Сходные виды: По мнению зарубежных специалистов, прежде всего следует помнить о галерине окаймленной, *Galerina marginata*, которая растет на пнях хвойных деревьев и ядовита, как бледная поганка. Благодаря сильной изменчивости летнего опенка (не зря его назвали "mutabilis") универсальных признаков, по которым его следует отличать от окаймленной галерины, фактически нет, хотя и перепутать их не так уж и просто. Во избежание несчастных случаев не следует собирать летние опята в хвойных лесах, на пнях хвойных деревьев.

В сухую погоду *Kuehneromyces mutabilis* утрачивает многие свои признаки, и тогда его можно перепутать буквально со всеми грибами, произрастающими в сходных условиях. Например, с опенком зимним (*Flammulina velutipes*), ложноопятами серно-желтым (*Hypholoma fasciculare*) и кирпично-красным (*Hypholoma sublateritum*), а также с ложноопенком серопластинчатым, *Hypholoma carpoides*.
. Мораль: не собирайте перестоявшие летние опята, которые уже и на себя не похожи.

Съедобность: Считается очень хорошим съедобным грибом, особенно в западной литературе. На мой взгляд, действительно очень хорош в отварном, "малосольном" виде. В остальных видах теряется.

Замечания автора: У зарослей летнего опенка часто устраивают засаду комары. Это правда. А еще летний опенок - самый вкусный, полезный и "собирабельный" гриб начала лета. Если бы только не эти комары.

