



Шляпка: Крупная, диаметром 4-10 см, в молодости полушаровидная, подушковидная, по мере созревания гриба раскрывается до полураспростертой, реже распростертой, нередко теряя при этом геометрическую правильность очертаний (край заворачивается вверх, становится волнистым, трескается и т.п.). В одном сростке обычно можно встретить шляпки разных размеров и форм. Цвет - серо-коричневый, поверхность гладкая, часто с налипшей землей. Мякоть шляпки толстая, белая, плотная, упругая, со слабым "рядовочным" запахом.

Пластинки: Относительно частые, белые, слабо приросшие или свободные.

Споровый порошок: Белый.

Ножка: Толщина 0,5-1,5 см, высота 5-10 см, цилиндрическая, нередко с утолщенной нижней частью, часто перекрученная, деформированная, сросшаяся основанием с другими ножками. Цвет - от белого до коричневатого (особенно в нижней части), поверхность гладкая, мякоть волокнистая, очень прочная.

Распространение: Поздний гриб; встречается с конца августа до конца октября в лесах различного типа, предпочитая специфические участки вроде лесных дорог, прореженных опушек; иногда попадает в парках, на лугах, в разнотравье. В большинстве случаев плодоносит крупными сростками.

Сходные виды: Специфика плодоношения позволяет уверенно отличить рядовку скученную от любого другого гриба; одиночный же *Lyophyllum decastes*, буде он встречен, опознать должно быть крайне трудно.

Съедобность: Рядовка скученная считается низкокачественным съедобным грибом; фактура мякоти дает исчерпывающий ответ, почему.

Замечания автора: Крепкие грибы-сростки рода *Lyophyllum* издавна приводили автора в замешательство.