



**Шляпка:** В молодости полушаровидная, затем просто выпуклая, со временем становится почти распростертой. Диаметр 4-6 см. Цвет желто-лимонный, с редкими чешуйками почти того же цвета (поэтому их не видно), поверхность клейкая, блестящая. Мякоть желтоватая, без особого запаха, вкус - горький.

**Пластинки:** Частые, приросшие, в молодости лимонно-желтые, по мере созревания спор темнеют. В молодости закрыты белым паутинистым частным покрывалом, которое, как правило, не оставляет заметного кольца.

**Споровый порошок:** Коричневый.

**Ножка:** Высота 5-10 см, толщина 0,5 - 1 см, цилиндрическая, плотная, в верхней части - одного цвета со шляпкой или даже более светлая, в низу темнее из-за многочисленных

чешуек.

**Распространение:** *Pholiota alnicola* встречается в августе-сентябре на остатках лиственных деревьев (особенно любит ольху и березу), а также на почве около них. Может образовывать большие колонии.

**Сходные виды:** Сразу следует отметить серно-желтый опенок (*Hypholoma fasciculare*), схожий с данной чешуйчаткой лишь условиями произрастания. Различий гораздо больше, и в том числе - доминирующий сернистый оттенок и более темные пластинки. От других же представителей рода *Pholiota* эту чешуйчатку отличить тоже, в общем-то, не сложно: чешуйчатка боровая (*Pholiota spumosa*) растет на сосновых пнях, а шляпка чешуйчатки огненной (*P. flammans*) вся покрыта крупными чешуйками.

**Дополнение:** Согласно Куртекиса, существует ряд очень близких видов жёлтых чешуйчаток:

1. *Pholiota alnicola* – родоначальница "ольховой" серии. Отличается сильным ароматным запахом и явно выраженной кортиной, которая буреет от основания. Кортину отлично видно на жёлтой ножке. Самая крупная в группе. Предпочитает ольху.
2. *Pholiota salicicola* – мелкая "ивовая" версия альниколы, не имеющая никакого запаха.
3. *Pholiota flavida* – более светлая версия, без запаха, растущая на хвойных породах.
4. *Pholiota apicrea* – более мощная и бледноокрашенная версия, отличается сильным запахом корицы в основании ножки.
5. *Pholiota pinicola* – это уже отдельный вид, более коричневато-рыжего оттенка, с мало выраженной кортиной и со слабым запахом. Предпочитает сосну.

**Съедобность:** *Pholiota alnicola* считается несъедобным грибом по причине горького вкуса - как, собственно, и большинство чешуйчаток. И, вместе с большинством, считается совершенно безосновательно.

**Замечания автора:** В июле нашел первую, на липе: она выглядывала из щели в коре на высоте моего роста и была похожа на фонарик. Сразу очень понравилась, хотя я, честно говоря, ее плохо понял. А в августе - полезли. В какую-то неделю (ближе к концу месяца) в лесу трудно было найти место, откуда не было бы видно ни одной колонии этого замечательного гриба. Лес был испещрен ярчайшими лимонно-желтыми пятнами. Не так уж и часто, между прочим, грибы демонстрируют нам такие чистые цвета.

А вот на вкус пробовать ольховую чешуйчатку у меня, честно говоря, мысли не возникло. Как-то само собой разумеется, что гриб этот несъедобен. Как и многое из того, что так приятно поедать глазами.