



Шляпка: Светлая, беловато-серая (от места прикрепления ножки распространяется более темная зона), с возрастом желтеет, эксцентрическая, веерообразная. Диаметр 4-8 см (до 15). Мякоть серовато-белая, запах слабый, приятный.

Пластинки: Нисходящие по ножке, редкие, толстые, белые.

Споровый порошок: Белый.

Ножка: Боковая (как правило; встречается и центральная), до 4 см в длину,

грязно-белая, у основания волосистая. Мякоть ножки жесткая, особенно у зрелых грибов.

Распространение: Растет с мая до октября на гниющей древесине, реже на живых ослабленных деревьях. При хороших условиях появляется большими группами, срастаясь ножками в пучки.

Сходные виды: Вешенку легочную можно спутать с вешенкой устричной, *Pleurotus ostreatus*, которая отличается более крепким сложением и темным цветом шляпки. Маленькие крепидоты (род *Crepidotus*) и панеллюсы (включая *Panellus mitis*) и в самом деле очень малы и на серьезное сходство с легочной вешенкой претендовать не могут.

Съедобность: Нормальный съедобный гриб.

Замечания автора: Про вешенку беловатую (или легочную) сказать мне решительно нечего. Вешенка себе и вешенка. Сама невзрачная, попадает не слишком часто, запаха и вкуса не имеет. Нормальный гриб.