



**Шляпка:** Диаметр до 25 см, покрыта крупными черепицеобразными отстающими бурыми чешуйками. Форма сначала плоско-выпуклая, затем вогнутая в середине. Сухая, бархатистая. Мякоть плотная, толстая, беловато-серая, запах пряный.

**Спороносный слой:** На нижней стороне шляпки имеются густые шипики конической формы, тонкие, заостренные, до 1 см длиной, вначале светлые, с возрастом темнеющие.

**Споровый порошок:** Бурый.

**Ножка:** Длина до 8 см, толщина до 2,5 см, цилиндрическая, сплошная, гладкая, нередко деформированная, цвета шляпки или светлее. Попадаются экземпляры с фиолетовой

ножкой.

**Распространение:** Растет в хвойных лесах в августе-ноябре. Встречается относительно нечасто, но обычно большими группами.

**Сходные виды:** Этот гриб можно перепутать только с близкородственными ежовиками. В частности, попадаетея *Sarcodon scabrosus*, отличающийся от рассматриваемого вида жгучеедким вкусом мякоти и красноватым или черно-синим основанием ножки.

**Съедобность:** Гриб вполне съедобен; всё, сказанное о ежовике желтом, *Hydnum repandum*, верно и для него. В том числе и странное предубеждение насчет горькости старых экземпляров.

**Замечания автора:** По своему "внутреннему ощущению" *Sarcodon imbricatus* весьма значительно отличается от своего желтого собрата. У *Hydnum repandum* мякоть резиновая, как у лисички обыкновенной (*Cantharellus cibarus*), а крапчатый ежовик своей структурой неожиданно напоминает хороший шампиньон. (Правда, этим его свойство с деликатесным, но каким-то домашним, неромантичным грибом благополучно исчерпывается.) Растет *Sarcodon imbricatus* (или просто попадаетея мне) в самых труднодоступных, темных, колючих, но, к счастью, вполне сухих местах. И это всё, что я могу сказать по настоящему вопросу.